

Cupravit® Mix

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Nombre común / ingrediente activo:
OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB

Clase química:
CÚPRICOS + DITIOCARBAMATOS

Formulación y concentración:
POLVO HUMECTABLE
39% equivalente a 230 g de i.a./Kg de Oxicloruro de cobre
30% equivalente a 300 g de i.a./Kg de Mancozeb

Categoría toxicológica:
IV - Ligeramente tóxico

No. de Registro:
RSCO-MEZC-1314-002-002-069

Modo de acción:
Actúa en diferentes procesos metabólicos vitales para la vida del hongo (se considera "multisitio").

Sistemicidad:

Sistémico	Contacto	Translaminar
	X	

Características biológicas:
FUNGICIDA.

Tiene una excelente protección como fungicida de contacto.
Debe ser aplicado estrictamente en forma preventiva.
Debe ser aplicado de manera uniforme para lograr una excelente cobertura del follaje.

USOS

Cultivo	Problema		Dosis/ha	Intervalo de Seguridad	Tolerancia EPA (ppm)	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico				
Apio	Tizón temprano o Mancha foliar	<i>Cercospora apii</i>	2.0 – 4.0 Kg	7		
	Tizón tardío	<i>Septoria apii</i>				
Cebolla	Manchas foliares y del Tallo	<i>Septoria apii</i>		0		
	Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>				
Calabacita	Mildiú veloso	<i>Peronospora destructor</i>		0		
	Melón, Pepino	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>				
Papa	Antracnosis	<i>Colletotrichum lagenarium</i>		5		
	Mancha de la hoja	<i>Alternaria cucumerina</i>				
Tabaco	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>		10		
	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>				
Jitomate	Mancha gris	<i>Stemphylium solani</i>		7		
	Moho de la hoja	<i>Cercospora nicotianae</i>				
	Pudrición del fruto	<i>Alternaria solani</i>				
		<i>Phytophthora infestans</i>				
		<i>Stemphylium sp.</i>				
		<i>Cladosporium fulvum</i>				
		<i>Colletotrichum sp.</i>				

Manzano	Putridiones negra y amarga Roña Mancha de la hoja Cáncer del tronco Tizón de fuego	<i>Phytophthora captorum</i> <i>Elsinoe</i> sp. <i>Alternaria</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Nectria galligena</i> <i>Erwinia amylovora</i> .	400 g/100 L Agua	30		
Papayo	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloesporioides</i>	300 – 400 g/100 L Agua	7		
Plátano	Chamusco Manchas del fruto Antracnosis	<i>Mycosphaerella musicola</i> <i>Macrophoma musae</i> <i>Colletotrichum</i> sp.		30		
Vid	Antracnosis Tizones Roya Mancha foliar	<i>Colletotrichum</i> sp. <i>Alternaria</i> sp. <i>Puccinia</i> sp. <i>Septoria</i> sp.		10		
Ornamentales	Antracnosis Tizones Roya Mancha foliar	<i>Colletotrichum</i> sp. <i>Alternaria</i> sp. <i>Puccinia</i> sp. <i>Septoria</i> sp.		0		
Zanahoria	Tizón Mancha foliar	<i>Alternaria dauci</i> <i>Cercospora carotae</i>	2-0 – 4.0 Kg	10		

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Caja 12 x 1 Kg

TOLERANCIAS EPA

I.A.	CULTIVO	LMR	I.S.	CULTIVO	LMR	I.S.
Oxcloruro de cobre	E X E N T O					
Mancozeb	Apio	5	7	Papa	1	7
	Calabacita	4	SL	Papayo	10	7
	Cebolla	0.5	SL	Pepino	4	5
	Jitomate	4	5	Plátano	4	30
	Manzano	7	30	Tabaco	Exento	10
	Melón	4	5	Vid	7	10
	Ornamentales	Exento	SL	Zanahoria	2	10