

Decis[®] FORTE

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Nombre común / ingrediente activo:
DELTAMETRINA

Clase química:
PIRETROIDE

Formulación y concentración:
CONCENTRADO EMULSIONABLE; 10.7% (100.0 g i.a. /L)

Categoría toxicológica:
Ligeramente tóxico

No. de Registro:
RSCO-INAC-0119-390-009-011

Modo de acción:
Es un producto lipofílico, por lo que es absorbido fácilmente por la cutícula de los insectos. Se han confirmado efectos complementarios de choque o derribe, repelencia (a altas dosis) e inapetencia (a dosis bajas). Afecta la transmisión del impulso nervioso, permite el incremento de la permeabilidad de la membrana a los iones sodio, afectando el sistema nervioso central y periférico. También afecta la sinápsis.

Sistemicidad:

Sistémico	Contacto	Translaminar	Ingestión
	X		X

Características biológicas:
Excelente control de Lepidópteros.
A dosis recomendadas es seguro para las abejas

USOS

Cultivo	Problemas		Dosis mL/ha	I. de S. (días)
	Nombre común	Nombre científico		
Sorgo	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150	1
	Mosquita de la panoja	<i>Contarinia sorghicola</i>	40 – 60*	
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150	1
Jitomate	Gusano del fruto	<i>Helicoverpa (Heliiothis) zea</i>	200 – 250	1
	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 - 225	
Tomate de cáscara	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 - 225	1
Papa	Palomilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	100 – 150	1
	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 - 225	
Chile	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 - 225	1
Berenjena	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	200 - 225	1

* Aplicar al observar las primeras moscas en las panojas, repetir en caso necesario a intervalos de 10 días.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Caja 12 x 1 L, caja 12 x 450 mL.

TOLERANCIAS EPA

CULTIVO	LMR	CULTIVO	LMR
Jitomate	0.2	Papa	0.04
Maíz (forraje)	0.7	Sorgo	0.5
Papa	0.01	Berenjena	0.2
Chile	0.3	Tomate de cáscara	0.3