

Sportak[®] 45 CE

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Nombre común / ingrediente activo:
PROCLORAZ

Clase química:
IMIDAZOL

Formulación y concentración:
CONCENTRADO EMULSIONABLE; 42.1% (Equivalente a 450 g i.a./L)

Categoría toxicológica:
LIGERAMENTE TOXICO (IV)

No. de Registro:
RSCO-FUNG-0363-303-009-042

Modo de acción:
Inhibidor de la biosíntesis del ergosterol.

Sistemicidad:

Sistémico	Contacto	Translaminar
	X	

Características biológicas:

USOS

Cultivo	Problema		Dosis/ha	Intervalo de Seguridad	Tolerancia EPA (ppm)	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico				
Cebada	Mancha foliar Moho blanco Cenicilla Marchitez negra Alternaria Botrytis Tizón de la hoja	<i>Septoria spp</i> <i>Fusarium spp</i> <i>Erysiphe graminis</i> <i>Cladosporium spp</i> <i>Alternaria spp</i> <i>Botrytis spp</i> <i>Helminthosporium spp</i> (= <i>Pyrenophora spp</i>)	1.0 – 1.5	30		Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas.
Ornamentales	Putridión de los bulbos	<i>Fusarium spp</i> <i>Rhizoctonia spp</i> <i>Sclerotinia spp</i> <i>Botrytis spp</i>	0.15 – 0.30 L/100 L agua	0		Tratamiento por inmersión en el caldo a 50 °C durante 15 minutos antes de la siembra. Use la dosis baja en gladiolos de colores claros.
	Dormilona	<i>Fusarium spp</i> <i>Sclerotinia spp</i>	0.10 L / 100 L de agua			Aplique al cuello y/o al follaje cuando aparezcan los primeros síntomas.
	Botrytis	<i>Botrytis spp</i> <i>Rhizoctonia spp</i>	0.25 L / 100 L de agua			Aplicación en drench al suelo en alto volumen de agua.

Trigo	Mancha foliar Moho blanco Cenicilla Marchitez negra Alternaria Botrytis Tizón de la hoja	<i>Septoria spp</i> <i>Fusarium spp</i> <i>Erysiphe graminis</i> <i>Cladosporium spp</i> <i>Alternaria spp</i> <i>Botrytis spp</i> <i>Helminthosporium spp</i> (= <i>Pyrenophora spp</i>)	1.0 – 1.5	30		Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas.
-------	--	---	-----------	----	--	---

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Caja 12 x 1 L